


# Viêm âm đạo dùng thuốc gì khỏi?

Viêm âm đạo là căn bệnh không còn xa lạ với chị em phụ nữ. Chính Vì thế, việc đi tìm câu trả lời hợp lý giúp câu hỏi: "Viêm âm đạo dùng thuốc gì?" đã trở thành một câu hỏi nóng hổi được chị em nữ giới quan tâm và tìm hiểu.



Hiện giờ, việc áp dụng thuốc như một liệu pháp điều trị nhiễm trùng bộ phận sinh dục đã trở cần thiết vô cùng thường gặp. Việc dùng các loại thuốc này không chỉ cho dịu nhẹ các dấu hiệu khó chịu của viêm nhiễm vùng kín mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn sự biến chuyển trầm trọng hơn của căn bệnh. Vậy thì viêm âm đạo dùng thuốc gì? Xin mời quý độc giả hãy cùng [pkphukhoa](http://pkphukhoa) đi tìm câu giải đáp thông qua bài viết dưới đây.

## Bệnh viêm âm đạo là gì?

Trước hết, để có thể trả lời chính xác câu hỏi: "Viêm bộ phận sinh dục sử dụng thuốc gì?" thì mọi bệnh nhân cần phải hiểu biết rõ về căn bệnh nhiễm trùng bộ phận sinh dục, những dấu hiệu thường gặp và nguyên do tạo ra căn bệnh.

Cô bé là một cơ quan của bạn gái có cấu trúc hình ống, được coi là cầu nối liên kết cô bé với tử cung trong cơ thể con gái. Đây chính là bộ phận sinh dục Bên cạnh của hệ thống sinh dục bạn gái và tiềm ẩn rất nhiều lần nguy cơ bị viêm vì nhiều lần nguồn gốc khác nhau trong những hoạt động hàng ngày.

Dịch âm đạo hay có mùi hôi hoặc chua không dễ chịu và dịch có thể có màu vàng hoặc trắng đục. Viêm nhiễm âm đạo không hạn chế ở độ tuổi, có xác suất xảy ra ở cả bệnh nhân trẻ em và đối tượng lớn.

Bạn có thể dễ dàng nhận ra thông qua một số triệu chứng viêm cô bé chính sau:

- Dịch tiết âm hộ đổi thay về lượng, màu sắc và mùi.
- Ngứa ngứa tại chỗ hoặc bắt gặp mắc phải kích ứng (đau đốn, rát, viêm).
- Đau rát trong thời kỳ thực hiện quan hệ.
- Khi tiểu tiện sẽ bắt gặp cảm thấy buốt và rát.
- Tình trạng nhiễm trùng bộ phận sinh dục nghiêm trọng có thể dẫn đến xuất huyết nhẹ

## **Nguyên nhân viêm âm đạo**

Viêm bộ phận sinh dục dùng thuốc gì còn phụ thuộc rất nhiều lần vào nguyên nhân gây ra bệnh viêm nhiễm ở mỗi người.

Đối với trẻ nhỏ, việc thấy tình trạng viêm cô bé thường kết nối với việc vệ sinh âm đạo không đúng cách, không rửa tay sau khi thực hiện các hoạt động như đi vệ sinh, dẫn đến tạo điều kiện cho vi rút phát triển. Hay có thể, virus có thể xuất phát từ tay không được làm sạch tiếp xúc với vùng kín.

Một loạt nguồn gốc không giống tạo nên tình trạng viêm nhiễm vùng kín tại độ tuổi nhỏ bao gồm sử dụng khăn giấy, bọt xà phòng tắm luôn nhiễm các loại virus, các loại vi rút như

Staphylococci, Streptococci... và các loại vi nấm như nấm Candida... Bên cạnh ra, căn bệnh viêm nhiễm vùng kín còn có thể do sự tấn công của giun kim.

Đối với trẻ em, nhiễm trùng bộ phận sinh dục thường biến chuyển bởi vi khuẩn có nguồn gốc từ hệ tiêu hóa. Tại người bệnh đối tượng trưởng thành, viêm bộ phận sinh dục thường phổ biến trong giai đoạn con gái đang có bầu. Khi trong tình trạng mang bầu, viêm nhiễm cô bé hay liên quan đến viêm nhiễm, xuất phát từ 3 nguồn gốc chính luôn được truyền qua đường quan hệ bao gồm virut, nhiễm nấm Candida và ký sinh trùng Trichomonas.

## **Viêm âm đạo dùng thuốc gì?**

Viêm nhiễm bộ phận sinh dục sử dụng thuốc gì là vấn đề được khá nhiều bạn gái để ý, đặc biệt với các bệnh nhân mới mắc lần đầu và đang bất gặp hoang mang. Tùy trường hợp căn bệnh tình mà những bác sĩ sẽ kê đơn thuốc trị viêm âm đạo sao cho phù hợp mỗi đối tượng. Sau đây là một số loại thuốc điều trị viêm vùng kín tập trung hiện nay:

### **Thuốc điều trị viêm âm đạo bởi nhiễm khuẩn**

Trong trường hợp viêm âm đạo bởi tạp khuẩn, thuốc Metronidazol hay được các chuyên gia chỉ định giúp việc chữa trị. Hình thức dùng bao gồm uống và đặt âm đạo. Ngoài ra, bác sĩ cũng thường dùng thuốc đặt Clindamycin với giai đoạn điều trị thường cải thiện trong vòng 7 ngày. Liều lượng của thuốc chữa nhiễm trùng bộ phận sinh dục bởi vi rút được phân chia thành 2 phác đồ:

- Với thuốc Metronidazol dạng viên uống: thường là 500mg/lần (tức 1 viên), uống 2 lần/ngày, cải thiện trong vòng 7 ngày. Nếu sử dụng Metronidazol sau dạng bôi 0.75% thì liều dùng là 5g/lần, 5 lần/ngày, cải thiện suốt 5 ngày. Còn đối với thuốc dạng bôi Clindamycin 2%, liều dùng là 5g/lần, làm 1 lần trước khi đi ngủ, trong vòng 7 ngày.
- Thuốc uống Tinidazole: Liều dùng là 2g/lần, sử dụng trong 2 ngày.
- Thuốc Clindamycin có thể uống hay đặt âm đạo: Liều uống là 300mg/lần, 2 lần/ngày trong vòng 7 ngày. Thuốc Clindamycin dạng đặt bộ phận sinh dục, liều dùng là 100mg/lần, 1 lần/ngày, vào tối ngay trước khi đi ngủ, kéo dài trong 3 ngày.

## **Thuốc trị viêm nhiễm âm đạo bởi nấm vi nấm**

Thuốc trị nhiễm trùng cô bé bởi nấm hay thường gặp vào thuốc Fluconazole dưới dạng viên uống hoặc dùng ở chỗ như Butoconazole, Terconazole... Tuy nhiên, nên nhất là chú ý tới xác suất tác động đối với enzyme làm theo nhiệm vụ chuyển hóa ở gan vì Fluconazole tạo nên. Một vài trường hợp viêm vì nấm Candida có liều sử dụng thuốc riêng:

- Trường hợp nhiễm trùng âm hộ mối liên quan đến nấm Candida không gây biến chứng: dùng thuốc Fluconazole 150mg dạng viên uống trong 1 liều duy nhất, đạt tỷ lệ thành công chữa trị tới 80 - 90%.
- Trường hợp viêm nhiễm âm hộ sự liên quan tới nấm Candida có xác suất tái phát: dùng Fluconazole với liều lượng 100, 150 hoặc 200mg theo con đường uống. Lịch trình dùng bao gồm ngày thứ nhất, thứ tư và thứ bảy trong liệu trình trị. Trong giai đoạn duy trì, đối tượng sẽ tiếp tục sử dụng Fluconazole trong vòng 6 tháng.
- Trường hợp viêm nhiễm cô bé với nấm Candida có gây ra nghiêm trọng: cần thiết sử dụng thuốc kháng nấm Fluconazole 150mg/lần sau dạng viên uống, mỗi liều biện pháp nhau 72 giờ.
- Trường hợp viêm nhiễm âm đạo bởi nấm Candida loại non - Albicans: Phương án điều trị giúp người hay là dùng thuốc kháng nấm Azole (ngoại trừ loại Fluconazole) dưới dạng viên uống. Thời gian sử dụng cải thiện từ 7 đến 14 ngày. Trong tình trạng tái phát, hãy chuyển sang sử dụng Acid Boric 600mg/lần, 1 lần/ngày, duy trì trong vòng 2 tuần.

## **Thuốc chữa nhiễm trùng âm hộ vì ký sinh trùng Trichomonas**

Trong trường hợp này, phương án chữa hay là thuốc Tinidazole luôn Metronidazol dạng uống. Liều lượng cụ thể bao gồm Metronidazole 500mg/lần, 2 lần/ngày, kéo dài trong vòng 7 ngày. Cần thiết chú ý rằng việc điều trị cả bạn cùng quan hệ tình dục là nhất là cần thiết để tránh nguy cơ tái lây truyền nhiễm ở cả đôi.

## **Thuốc chữa trị bệnh viêm teo cô bé**

Với trường hợp người bệnh mắc phải tình trạng viêm teo âm đạo, chiến lược chữa trị có thể gồm việc dùng hormone Estrogen, dạng viên uống hay dùng ở chỗ. Tuy nhiên, hiện nay, ưu tiên dùng

Estrogen tại chỗ hơn. Trong thời kỳ điều trị bằng thuốc, người cần kiểm soát chặt chẽ xác suất gây ra huyết khối tĩnh mạch.

Phương pháp chữa trị không sử dụng thuốc gồm việc bổ sung những chất giữ ẩm, chất bôi trơn và khuyến khích người tiếp tục duy trì hoạt động tình dục.

Hiện nay, nhiễm trùng cổ bé đã trở thành một hiện tượng phổ biến bất gặp tại đàn bà từ già tới trẻ. Vậy tóm lại, viêm âm hộ dùng thuốc gì? Tình trạng viêm bộ phận sinh dục có khả năng được phân loại theo rất nhiều lần nhóm nguyên do khác nhau, với mỗi nhóm nguồn gốc này, quá trình chẩn đoán và xác định liệu pháp điều trị tương ứng là nên.

Thời kỳ chỉ định liệu sử dụng thuốc trị viêm nhiễm cổ bé phải tuân theo sự hướng dẫn nghiêm ngặt từ phía chuyên gia uy tín luôn chuyên gia y tế. Quan trọng hơn, bệnh nhân không nên tự sử dụng thuốc kháng sinh luôn bất kỳ loại thuốc điều trị viêm bộ phận sinh dục nào nếu chưa được kiểm tra và chẩn đoán nguyên nhân tạo nên tình trạng viêm nhiễm.

[Top 7 bác sĩ khám phụ khoa giỏi ở Hà Nội](#)

[Gợi ý 12 địa chỉ khám phụ khoa ở đâu tốt tại Hà Nội](#)

[Viêm lộ tuyến cổ tử cung độ 3 có nguy hiểm không?](#)

[15 cách giảm đau bụng kinh nhanh nhất có thể bạn chưa biết](#)

[Top 12 địa chỉ khám hiếm muộn ở đâu tốt tại Hà Nội 2023](#)

[Chi phí chữa sùi mào gà hết bao nhiêu tiền? Bảng giá 2023](#)

[Chi phí đốt viêm lộ tuyến cổ tử cung bao nhiêu tiền? Bảng giá 2023](#)

[7 địa chỉ đốt viêm lộ tuyến cổ tử cung ở đâu tốt tại Hà Nội?](#)

[Giải đáp: Chi phí khám phụ khoa bao nhiêu tiền? Bảng giá 2023](#)

[Top 12 địa chỉ khám phụ khoa uy tín ở Hà Nội 2023](#)

[Review 9 địa chỉ phá thai ở đâu an toàn nhất Hà Nội](#)

